

Nota sobre pandemias

Tamiflu®

Las personas que se han infectado y que presentan síntomas de influenza pueden curarse con el medicamento contra la influenza Tamiflu®, sujeto a prescripción médica. Tamiflu® debe tomarse lo antes posible dentro de las 36 horas después de que se presenten los síntomas de influenza. El Tamiflu® es el único medicamento que atenúa el desarrollo de la enfermedad a tal grado que existe una alta probabilidad de sobrevivir.

Cuando se presenten los síntomas de la influenza, acuda de inmediato a un médico. Es el médico que da el diagnóstico y decide si deberá tomar Tamiflu®. Los síntomas son **fiebre repentina arriba de 38°C y sentirse muy mal**.

Dosis

- Adultos y niños de más de 40 kg (aprox. 8 años o mayores) 1 cápsula en la mañana y en la tarde durante 5 días. Eso es independiente de su hora de comida.
- A los niños de más de 1 año se les suministran las siguientes cantidades:

<15 kg	30 mg	2 veces al día durante 5 días
>15 kg hasta 23 kg	45 mg	2 veces al día durante 5 días
>23 kg hasta 40 kg	60 mg	2 veces al día durante 5 días
>40 kg	75 mg	2 veces al día durante 5 días

Embarazo y lactancia

No existen suficientes datos sobre el efecto de Tamiflu® durante el embarazo, por lo tanto se deberá tomarlo sólo cuando sea absolutamente necesario. Durante la ingesta del Tamiflu® no se debe amamantar.

Almacenamiento

Almacene el Tamiflu® en un lugar seco a una temperatura menor de 25°C y evite su exposición directa a los rayos solares.

En caso de preguntas, llame a:

Centro de salud:	+41 56 205 4444
Celular de Dr. Kissling:	+41 79 334 4625
Fuera de las horas de oficina:	+41 56 205 1111

Ifa Instituto de Medicina Laboral, Kreuzweg 3, 5400 Baden 056 205 44 44